

Fiche de consentement éclairé

Vidéo-capsule endoscopique

Pourquoi une endoscopie par vidéocapsule ?

Cet examen permet d'explorer les segments de l'intestin grêle qui ne sont pas accessibles par une gastroscopie ou une coloscopie. Il permet d'obtenir des images par la vidéocapsule de l'ensemble du petit intestin et de rechercher des modifications qui peuvent être à l'origine de vos troubles, telles qu'une inflammation de la muqueuse, des saignements, des ulcères, des polypes ou des lésions tumorales.

Cet examen ne permet pas de procéder à des gestes thérapeutiques (biopsie, coagulation, polypectomie, etc....), mais uniquement de visualiser les images. Il peut être complété par une entéroscopie en cas de lésions décelées.

Pourquoi ce document ?


Il est destiné à vous informer du déroulement de l'examen, des gestes complémentaires qui peuvent l'accompagner et des risques qui leur sont associés. Vous avez ainsi la possibilité de préparer vos questions à l'avance.

Veillez compléter, signer et apporter ce document lors de l'examen, s'il vous plaît.

Comment se déroule l'examen ?

L'examen implique l'ingestion d'une capsule à usage unique munie d'une caméra (de la taille d'un gros comprimé comme le Dafalgan®). Celle-ci progresse le long du tube digestif de manière naturelle tout en prenant des images. Ces images sont transmises à un petit boîtier enregistreur placé dans une ceinture que vous porterez autour de votre taille et qui ne devra pas être enlevée durant toute la durée de l'examen (8 heures). La capsule est fabriquée dans un matériau résistant à la digestion. Elle sera éliminée par les voies naturelles (selles) en fonction de votre transit intestinal et ne nécessite pas d'être récupérée.

Vous devez rester à jeun encore deux heures après l'ingestion de la capsule. Après deux heures, vous pourrez boire des liquides clairs et après quatre heures, vous pourrez manger normalement. Au bout de huit heures d'enregistrement, la ceinture et le boîtier pourront être enlevés et les images seront téléchargées sur un ordinateur. Ces images seront visualisées et analysées par le médecin.



Quels sont les préparatifs nécessaires ?

La prise de médicaments **à base de fer** doit être arrêtée **7 jours avant** l'examen.

L'endoscopie par vidéocapsule exige un nettoyage de l'intestin grêle. Vous devrez suivre un régime sans fibre le jour précédent l'examen. Vous avez également reçu à cet effet une ordonnance pour du Clensia (2 sachets A + 2 sachets B à diluer dans 1L d'eau) à boire la veille de l'examen entre 18h et 19h.

VOUS DEVEZ ÊTRE A JEUN (sans manger) dès la prise de la préparation CLENSIA, la veille à 18h, mais il est permis de boire de l'eau plate jusqu'à 2h avant l'examen.

Vous pouvez prendre vos médicaments habituels avec un tout petit peu d'eau le matin même.

Si vous répondez positivement à un des éléments suivants :

- Vous souffrez de diabète
- Vous êtes atteint d'un rétrécissement intestinal (sténose)
- Vous avez déjà eu un iléus paralytique (occlusion intestinale)
- Vous êtes porteur d'un pace-maker/défibrillateur/neurostimulateur ou un implant métallique
- Vous prenez des anticoagulants ou antiagrégants
- Vous êtes enceinte

VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC VOTRE MEDECIN OU AVEC NOUS 1 SEMAINE AVANT L'EXAMEN.

Quels sont les risques de l'endoscopie par vidéocapsule ?

L'endoscopie par vidéocapsule ne comporte que très peu de risques. Dans des cas isolés, une occlusion intestinale par rétention de la capsule peut se produire nécessitant une ablation endoscopique ou chirurgicale de la capsule (<1%). Le risque est plus élevé chez les patients ayant déjà souffert d'une occlusion intestinale ou chez qui on suppose un rétrécissement intestinal (sténose). Dans ce cas une endoscopie par vidéocapsule n'est pas possible.

En cas de survenue d'une complication (fièvre, nausées, douleurs abdominales ou vomissements), veuillez prendre contact avec le Centre des Maladies Digestives, votre médecin traitant ou les urgences.

Comment dois-je me comporter durant et après l'examen ?

Après l'ingestion de la capsule, vous recevrez les consignes horaires pour vous réhydrater et vous réalimenter. Durant l'examen, il est important de se mobiliser pour stimuler le transit intestinal.

A la fin de l'examen, vous pourrez vous alimenter et vous hydrater normalement.

Surveillez l'évacuation de la capsule. Si vous ne pouvez pas affirmer clairement l'évacuation de celle-ci, un contrôle peut être effectué chez nous ou une radiographie peut s'avérer nécessaire.

Dans tous les cas, un examen par résonance magnétique (IRM) ne peut pas être effectué si la capsule se trouve dans l'organisme. Il risquerait de causer des dommages intestinaux importants.

Je, soussigné(e), certifie avoir pris connaissance de ce qui précède (les modalités, le déroulement et les risques de l'examen ou de l'intervention) au minimum 24h à l'avance et je consens à la réalisation de cet examen.

Lieu et date	Nom et Prénom du patient	Signature
.....		

Lieu et date	Nom et Prénom du médecin	Signature
.....		