

Fiche de consentement éclairé

Entéroscopie basse

Pourquoi une entéroscopie basse ?

L'entéroscopie basse est utilisée pour atteindre des sections plus éloignées de l'intestin grêle qui ne peuvent être atteintes par une coloscopie.

Cet examen permet d'examiner la muqueuse de l'intestin grêle et, en même temps, de faire des prélèvements (biopsies), de détecter et/ou traiter des lésions hémorragiques, d'enlever des polypes, de dilater des rétrécissements ou d'extraire des corps étrangers.

Pourquoi ce document ?

Il est destiné à vous informer du déroulement de l'examen, des gestes complémentaires qui peuvent l'accompagner et des risques qui leur sont associés. Vous avez ainsi la possibilité de préparer vos questions à l'avance.

Veillez compléter, signer et apporter ce document lors de l'examen, s'il vous plaît.

Comment se déroule l'examen ?

Cet examen est réalisé sous anesthésie générale. Un document séparé vous sera envoyé pour vous informer de cette partie. Lors de votre admission, une perfusion sera posée dans le bras pour permettre l'administration des médicaments.

Un instrument flexible muni d'une caméra (entéroscope) est introduit par l'anus dans le gros intestin préalablement nettoyé afin d'atteindre l'intestin grêle à la recherche de modifications de la muqueuse.

Si de telles modifications sont découvertes, différentes interventions sont possibles.

Quelles sont les interventions supplémentaires possibles en cours d'entéroscopie ?

Durant cet examen, des prélèvements de tissus (biopsies) peuvent être effectués et envoyés pour analyse. Des polypes peuvent être enlevés (polypectomie). En cas de rétrécissement, une dilatation est possible. Si des lésions hémorragiques sont détectées, différentes techniques sont utilisées pour les maîtriser.

Ces gestes seront en principe discutés avec vous avant l'examen.

Est-ce que l'examen est douloureux ?

L'examen peut à certains moments être douloureux, surtout si vous avez déjà subi des chirurgies dans le ventre ou le petit bassin. La durée de cet examen est également plus importante que celle pour une coloscopie standard. Pour ces raisons, il doit se faire sous anesthésie générale.

Quels sont les risques liés à ces interventions supplémentaires ?

Les risques liés à une simple entéroscopie sont rares, mais, dans certains cas, des complications peuvent survenir. Il s'agit de saignements qui apparaissent lors de l'intervention ou la semaine suivante dans la majorité des cas, ils peuvent être traités par endoscopie. Rarement, des perforations de la paroi intestinale vont être observés, nécessitant parfois une intervention chirurgicale.

Quels sont les préparatifs nécessaires ?

L'entéroscopie exige un nettoyage approfondi du gros intestin.

Veillez suivre exactement nos instructions qui sont détaillées dans la feuille de préparation à la coloscopie annexée.

VOUS DEVEZ ÊTRE A JEUN (sans manger) 6 heures avant l'examen mais il est permis de boire de l'eau plate jusqu'à 2h avant l'examen. Il est interdit de fumer dans les 12h avant l'examen.

Pour les examens prévus l'après-midi, vous pouvez prendre une collation le matin avant 8 heures.

Si vous prenez un des médicaments suivants :

- **Des anticoagulants (Sintrom, Marcoumar, Xarelto, Pradaxa, Eliquis)**
- **Un antiagrégant type Plavix/Clopidogrel**
- **Des médicaments contenant de l'aspirine**
- **Si vous êtes diabétique insulino-requérant**
- **Si vous portez un pace-maker ou un défibrillateur**

VEUILLEZ LE TRANSMETTRE A L'ANESTHESISTE QUI PRENDRA CONTACT AVEC VOUS.

Pour tous les autres médicaments, veuillez suivre ses recommandations.

Comment vous déplacer après votre examen ?

Vous allez recevoir une anesthésie générale pour cet examen ce qui va vous empêcher de conduire, dès lors, veuillez vous organiser pour les trajets. Prévoyez d'être conduit par un proche, d'utiliser les transports publics ou un taxi. Conduire après une anesthésie générale est non seulement dangereux mais illégal, car vos capacités de réaction peuvent être altérées.

Il est donc interdit de conduire pendant les 12 heures qui suivent l'examen, de signer des documents importants et d'utiliser des machines.

Prenez note que votre présence à la Clinique va durer une demi-journée environ.

Que se passe-t-il après l'examen ?

Dans les heures après l'examen, vous pouvez ressentir un sentiment de pression dans le ventre (sensation de ballonnement). Si ces douleurs augmentent ou deviennent très fortes, si vous développez de la fièvre ou que vous observez un saignement par l'anus, informez-nous immédiatement ou, à défaut, informez votre médecin traitant ou l'hôpital le plus proche. Les urgences de la clinique Cecil peuvent également vous assister (021.310.50.30), notamment en dehors des heures de réponse de notre secrétariat.

Je, soussigné(e), certifie avoir pris connaissance de ce qui précède (les modalités, le déroulement et les risques de l'examen ou de l'intervention) au minimum 24h à l'avance et je consens à la réalisation de cet examen.

Lieu et date	Nom et Prénom du patient	Signature
.....		

Lieu et date	Nom et Prénom du médecin	Signature
.....		