

Fiche de consentement éclairé

Oeso-gastro-duodénoscopie OGD

Pourquoi une gastroscopie ?

Cet examen permet d'examiner l'œsophage, l'estomac ainsi que le duodénum et de détecter et/ou traiter les maladies touchant ces organes (par ex : inflammation, ulcère, varices, polypes ou tumeur)

Pourquoi ce document ?


Il est destiné à vous informer du déroulement de l'examen, des gestes complémentaires qui peuvent l'accompagner et des risques associés. Vous avez ainsi la possibilité de préparer vos questions à l'avance.

Veillez compléter, signer et apporter ce document lors de l'examen.

Comment se déroule l'examen ?

Une perfusion sera posée sur le bras pour permettre l'administration d'un sédatif et d'autres médicaments durant l'examen.

Une bague, insérée dans votre bouche facilitera le passage de l'endoscope (instrument flexible). Celui-ci est introduit par la bouche pour accéder à l'œsophage, l'estomac et le duodénum à la recherche de modifications de la muqueuse. Si de telles modifications sont découvertes, différentes interventions peuvent être effectuées.



Quelles sont les interventions possibles en cours de gastroscopie ?

Durant cet examen, des prélèvements de tissus (biopsies) peuvent être effectués et envoyés pour analyse.

Lors de saignements, différentes techniques sont utilisées pour les maîtriser.

Ces gestes seront en principe discutés avec vous avant l'examen.

Est-ce que l'examen est douloureux ?

De manière générale, l'examen et les interventions complémentaires sont indolores, mais peuvent être inconfortables. Parfois des réflexes de vomissements peuvent survenir. Pour cette raison, nous proposons une sédation de courte durée.

Quels sont les risques liés à ces interventions supplémentaires ?

Les complications résultant d'une simple gastroscopie sont très rares (0,2%). Cependant, une infection, des lésions dentaires selon l'état de la dentition, un saignement ou une lésion de la

paroi (perforation) peuvent survenir suite à l'une des interventions supplémentaires décrites. Les autres risques comprennent des enrouements, des troubles de la déglutition, des brûlures d'estomac, des diarrhées et des ballonnements temporaires.

L'administration de sédatifs peut induire des troubles respiratoires et des troubles cardiovasculaires, de même qu'une réaction allergique aux médicaments. Pour ces raisons, le patient est monitoré durant toute l'intervention (fréquence cardiaque, tension, saturation en oxygène) et sous la surveillance de notre équipe médicale et infirmière formée à la réanimation.

Quels sont les préparatifs nécessaires ?

Pour l'examen, le tube digestif supérieur ne doit contenir aucun résidu alimentaire.

VOUS DEVEZ ÊTRE A JEUN (sans manger) 6 heures avant l'examen, vous pouvez cependant vous hydrater avec uniquement de l'eau plate jusqu'à 2h avant l'examen. Il est interdit de fumer dans les 12h avant l'examen.

Si vous prenez un des médicaments suivants :

- **Des anticoagulants (Sintrom, Marcoumar, Xarelto, Pradaxa, Eliquis)**
- **Un antiagrégant type Plavix/Clopidogrel**
- **Des médicaments contenant de l'aspirine**
- **Si vous êtes diabétique**
- **Si vous portez un pace-maker ou défibrillateur**

VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC VOTRE MÉDECIN GÉNÉRALISTE OU AVEC NOUS 1 SEMAINE AVANT L'EXAMEN.

Tous les autres médicaments peuvent être pris normalement avec un peu d'eau, notamment ceux pour l'hypertension.

Comment vous déplacer après votre examen ?

Vous allez recevoir une sédation pour cet examen ce qui va vous empêcher de conduire, dès lors, veuillez vous organiser pour les trajets. Prévoyez d'être conduit par un proche, d'utiliser les transports publics ou un taxi. Conduire après une sédation est non seulement dangereux mais illégal, car vos capacités de réaction peuvent être altérées.

Il est donc interdit de conduire pendant les 12 heures qui suivent l'examen, de signer des documents importants et d'utiliser des machines.

Prenez note que votre présence au Centre va durer 2 heures environ.

Que se passe-t-il après l'examen ?

Dans les heures qui suivent l'examen, vous pouvez ressentir un sentiment de pression dans le ventre (sensation de ballonnement). Si des biopsies ont été effectuées, vous pouvez sentir des aigreurs d'estomac ou des crampes durant 24-48 heures après l'examen. Si ces douleurs augmentent ou deviennent très fortes, si vous développez de la fièvre ou que vous observez un saignement par l'anus, informez-nous immédiatement ou, à défaut, informez votre médecin traitant ou l'hôpital le plus proche. Les urgences de la clinique Cecil peuvent également vous assister (021.310.50.30), notamment en dehors des heures de réponse de notre secrétariat.

Je, soussigné(e), certifie avoir pris connaissance de ce qui précède (les modalités, le déroulement et les risques de l'examen ou de l'intervention) au minimum 24h à l'avance et je consens à la réalisation de cet examen.

Lieu et date	Nom et Prénom du patient	Signature
.....		

Lieu et date	Nom et Prénom du médecin	Signature
.....		



En scannant ce code QR, vous accédez à notre site web ainsi qu'à notre assistante virtuelle Mina.