

## Fiche de consentement éclairé

### Entéroscopie haute

#### Pourquoi une entéroscopie haute ?

L'entéroscopie haute est utilisée pour atteindre des sections plus éloignées de l'intestin grêle qui ne peuvent être atteintes par une gastroscopie.

Cet examen permet d'examiner la muqueuse de l'intestin grêle et, en même temps, de faire des prélèvements (biopsies), de détecter et/ou traiter des lésions hémorragiques, d'enlever des polypes, de dilater des rétrécissements ou d'extraire des corps étrangers.

#### Pourquoi ce document ?

Il est destiné à vous informer du déroulement de l'examen, des gestes complémentaires qui peuvent l'accompagner et des risques qui leur sont associés. Vous avez ainsi la possibilité de préparer vos questions à l'avance.

**Veuillez compléter, signer et apporter ce document lors de l'examen, s'il vous plaît.**

#### Comment se déroule l'examen ?

Cet examen est réalisé sous anesthésie générale. Un document séparé vous sera envoyé pour vous informer de cette partie. Lors de votre admission, une perfusion sera posée dans le bras pour permettre l'administration des médicaments.

Une fois endormi par les anesthésistes, une bague sera insérée dans votre bouche afin de protéger vos dents. Un instrument flexible muni d'une caméra (entéroscope) sera introduit par la bouche pour accéder à l'œsophage, l'estomac et l'intestin à la recherche de modifications de la muqueuse. Si de telles modifications sont découvertes, différentes interventions peuvent être effectuées.



#### Quelles sont les interventions possibles au cours de l'entéroscopie haute ?

Durant cet examen, des prélèvements de tissus (biopsies) peuvent être effectués et envoyés pour analyse. Des polypes peuvent être enlevés (polypectomie). Si des lésions hémorragiques sont détectées, différentes techniques sont utilisées pour les maîtriser.

Ces gestes seront en principe discutés avec vous avant l'examen.

#### Est-ce que l'examen est douloureux ?

De manière générale, l'examen et les interventions complémentaires sont indolores, mais peuvent être inconfortables et long. Parfois des réflexes de vomissements peuvent survenir. Pour ces raisons, nous proposons de faire cet examen sous anesthésie générale.

### **Quels sont les risques liés à ces interventions supplémentaires ?**

Les complications résultant d'une entéroscopie haute sont très rares. Cependant, une infection, des lésions dentaires selon l'état de la dentition, un saignement ou une lésion de la paroi (perforation) peuvent survenir suite à l'une des interventions supplémentaires décrites. D'autres risques comprennent des enrouements, des troubles de la déglutition, des brûlures d'estomac, des diarrhées et des ballonnements temporaires, peuvent être observés à la suite de l'examen.

### **Quels sont les préparatifs nécessaires ?**

Pour l'examen/le traitement, le tube digestif supérieur ne doit contenir aucun résidu alimentaire.

**VOUS DEVEZ ÊTRE A JEUN (sans manger) 6 heures avant l'examen, vous pouvez cependant vous hydrater avec uniquement de l'eau plate jusqu'à 2h avant l'examen.**  
**Il est interdit de fumer dans les 12h avant l'examen.**

**Si vous prenez un des médicaments suivants :**

- **Des anticoagulants (Sintrom, Marcoumar, Xarelto, Pradaxa, Eliquis)**
- **Un antiagrégant type Plavix/Clopidogrel**
- **Des médicaments contenant de l'aspirine**
- **Si vous êtes diabétique insulino-requérant**
- **Si vous portez un pace-maker ou un défibrillateur**

**VEUILLEZ LE TRANSMETTRE A L'ANESTHESISTE QUI PRENDRA CONTACT AVEC VOUS.**

Pour les autres médicaments, veuillez suivre ses recommandations.

### **Comment vous déplacer après votre examen ?**

Vous allez subir une narcose pour cet examen ce qui va vous empêcher de conduire, dès lors, veuillez vous organiser pour les trajets. Prévoyez d'être conduit par un proche, d'utiliser les transports publics ou un taxi. Conduire après une narcose est non seulement dangereux mais illégal, car vos capacités de réaction peuvent être altérées.

**Il est donc interdit de conduire pendant les 12 heures qui suivent l'examen, de signer des documents importants et d'utiliser des machines.**

**Prenez note que votre présence à la Clinique va durer une demi-journée environ.**

### Que se passe-t-il après l'examen ?

Dans les heures qui suivent l'examen, vous pouvez ressentir un sentiment de pression dans le ventre (sensation de ballonnement). Si des biopsies ont été effectuées, vous pouvez sentir des aigreurs d'estomac ou des crampes durant 24-48 heures après l'examen. Si ces douleurs augmentent ou deviennent très fortes, si vous développez de la fièvre ou que vous observez du sang dans vos selles, informez-nous immédiatement ou, à défaut, informez votre médecin traitant ou l'hôpital le plus proche. Les urgences de la clinique Cecil peuvent également vous assister (021.310.50.30), notamment en dehors des heures de réponse de notre secrétariat.

Je, soussigné(e), certifie avoir pris connaissance de ce qui précède (les modalités, le déroulement et les risques de l'examen ou de l'intervention) au minimum 24h à l'avance et je consens à la réalisation de cet examen.

| Lieu et date | Nom et Prénom du patient | Signature |
|--------------|--------------------------|-----------|
| .....        | .....                    | .....     |

| Lieu et date | Nom et Prénom du médecin | Signature |
|--------------|--------------------------|-----------|
| .....        | .....                    | .....     |